

COMUNICAÇÕES

SCHWANOMA MALIGNO PRÉ-SACRAL (RETRORRETAL)

Jorge Bedran Filho
Farid Jacob Abi Rached
Alder Olivier Bedran
Jorge Hage Zbeidi
Mario Alberto Souza Paino

JRA, 45 anos, masculino, branco, tratorista, com história de sangramento anal às dejeções; o toque retal evidenciou grande massa retroretal e, à sigmoidoscopia, volumosas hemorróidas internas; bioquímica, raio-X de tórax e urografia ndn; o enema opaco duplo de contraste evidenciou massa desviando o reto com aumento do espaço pré-sacral. Operado em novembro 1980, na posição de *Dépage*, com raquianestesia, via de acesso posterior do reto com exérese do cóccix, enucleação do tumor globóide, liso, bocelado, com 10 cm no maior diâmetro, de consistência firme e com áreas amolecidas, com bom plano de clivagem; drenagem do espaço e utilização de antibiótico.

O diagnóstico histopatológico feito com coloração pela Hematoxilina-eosina demonstrou tratar-se de neurilemoma (Schwanoma) de baixa malignidade, caracterizada pela presença de mitoses freqüentes nos diversos campos histológicos porém sem pleomorfismo celular. Observa-se de particular neoplasia conjuntiva fusiforme com núcleos alongados e em paliçada e com arranjos organóides, do neurilemoma.

O diagnóstico diferencial é feito com leiomiomas através da coloração pela Hematoxilina fosfotúngstica de Mallory, demonstrando ausência de fibrilas.

Boa evolução pós-operatória, com radioterapia subsequente. Controle em julho 1981 e paciente bem.

A apresentação deste caso se prende à raridade da neoplasia nesta localização pois é mais comum em partes moles e mediastino.

Assim é que a consulta feita no Serviço de Informações sobre Câncer – LACRIP registra apenas um caso publicado de neurilemoma da região pré-sacral e mesmo assim benigno, que media 13 cm e que foi operado por via abdominossacral.

Concluimos chamando a atenção para os seguintes tópicos:

- 1) Raridade da neoplasia nesta localização
- 2) A via de acesso única utilizada foi favorecida pelo bom plano de clivagem da neoplasia
- 3) Radioterapia como terapêutica complementar
- 4) Trata-se de neoplasia de baixa malignidade, isto é, apresenta boa diferenciação histopatológica, o que favorece o bom prognóstico; o seu caráter bem delimitado favoreceu o bom plano de clivagem.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. LACRIP – Latin American Cancer Research Information Project. Benign Neurilemmoma Manifesting as a Presacral (Retrorectal) Mass: Report a case. KOVASCIK PJ; SIMSTEIN NL; CROSS GH. Dis Colon Rectum, 21(3): 199-202, 1978.

Trabalho realizado na Gastroclínica de Araraquara – Av. José Bonifácio, 819, tel.: 22-2666 – Araraquara – SP – Cep 14800 – Dr. Jorge Bedran Filho.

– Proibida a reprodução total ou parcial para fins comerciais