

RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1 - A resposta certa é a letra B

O eritrasma é devido a infecção pelo *Corynebacterium minutissimum*, podendo ser a causa do prurido anal nos casos crônicos. O diagnóstico é feito com a ajuda de lâmpada ultravioleta, que mostra uma fluorescência perianal característica. O tratamento deve ser feito com eritromicina oral (1,0 g/dia) durante 10 dias.

Goligher JC. Cirurgia do Ânus, Reto e Colo. 5ª ed. Editora Manole 1990; 262-265.

2 - A resposta certa é a letra A

Os pacientes com leucemia têm uma predisposição para desenvolverem lesões sépticas na região perianal e perirretal, principalmente na fase aguda ou na fase crônica descompensada da doença. A radioterapia está indicada na dose de 300 a 400 rads durante um a três dias, podendo ser repetida após uma semana. Geralmente três a cinco dias após o tratamento a endureção regride ou há drenagem espontânea de material necrótico. Se houver o aparecimento de uma fístula, esta poderá ser tratada cirurgicamente, quando a leucemia estiver em fase de remissão.

Goligher JC. Cirurgia do Ânus, Reto e Colo. 5ª ed. Editora Manole 1990; 194

3 - A resposta certa é a letra D

Na obstrução intestinal por um tumor de colo direito, a cirurgia indicada é a hemicolectomia direita com anastomose primária, porque o colo dilatado é removido e o intestino delgado encontra-se apropriado para a anastomose.

Wexner SD, Vernava AM. Clinical Decision Making in a Colorectal Surgery. Igaku-Shoin Medical Publishers, Inc 1995; 336-337.

4 - A resposta certa é a letra B

Em trabalho realizado no Serviço de Colo e Reto do Rush-Presbyterian - St. Luke's Medical Center, Chicago, Illinois, 16 pacientes com sangramento retal, anteriormente já submetidos a vários tratamentos (eletrocoagulação, laser, enemas de corticóide, colostomias), foram tratados com instilação de formalina a 4% em cotas de 50 ml por vez. A solução fica em contacto com a mucosa por 30 segundos. O sangramento cessou em 12 pacientes (75%) com uma única aplicação e reduziu acentuadamente em três outros. Somente um paciente necessitou de três aplicações.

Saclarides TJ, King DG, Franklin DJ, Doolas A. Formalin Instillation for Refractory Radiation-Induced Hemorrhagic Proctitis. Dis Colon Rectum 1996; 39: 196-199.