

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

CARLOS EDUARDO DA LUZ MOREIRA, TSBCP

1. A causa mais comum de hemorragia digestiva cuja origem encontra-se no intestino delgado é:

- a) divertículo de Meckel
- b) neoplasia
- c) doença de Crohn
- d) angiodisplasia
- e) fistula aarto-entérica

2. O local mais freqüente do aparecimento de divertículos em populações asiáticas é:

- a) colo esquerdo
- b) reto
- c) colo direito
- d) intestino delgado
- e) todo o colo

3. A ressecção do sigmóide com anastomose primária e lavagem intestinal intra-operatória está contra-indicada nos pacientes com Diverticulite aguda que, segundo a classificação de Hinckley, se encontram nos estágios:

- a) III e II
- b) I e II
- c) I e IV
- d) II e IV
- e) III e IV

4. A técnica cirúrgica para cura da Procidência do Reto através da mobilização e fixação do reto, plicatura do elevador do ânus e ressecção segmentar do sigmóide redundante com anastomose primária chama-se:

- a) Frykman
- b) Altmeier
- c) Ripstein
- d) Notaras
- e) Moschowitz

ERRATA

VOLUME 17 Nº 3 PÁGINA 212

Na seção especial - Tribuna Livre: Como eu Faço o nome do autor Francisco Sérgio Pinheiro Regadas foi impresso sem sua titulação: "TSBCP".

No 7º parágrafo 2ª linha onde se lê "...de 4 membros titulares de nossa sociedade" corrige-se para "...de 4 membros de nossa sociedade".