

1 - No preparo de colo com fosfato de sódio oral, podemos encontrar as seguintes alterações eletrolíticas:

- a) diminuição de sódio e potássio
- b) aumento de potássio e cálcio
- c) diminuição de fosfato e sódio
- d) aumento de potássio e fosfato
- e) diminuição de cálcio e potássio

2 - Os pacientes portadores de coccidínia são tratados de maneira mais eficaz, com o uso de medicamentos:

- a) antidepressivos
- b) vasodilatadores coronarianos
- c) anticonvulsivantes
- d) laxativos
- e) antipsicóticos

3 - A retossigmoidoscopia de um paciente HIV positivo, com quadro clínico de enterorragia, mostrou a presença de nódulo elevado, arredondado, séssil, de 3 cm de diâmetro e avermelhado, no 1/3 inferior do reto. O diagnóstico mais provável é:

- a) adenoma tubular
- b) sarcoma de Kaposi
- c) hemangioma
- d) linfoma não-Hodgkin
- e) amebíase

4 - Um paciente com queixas de cólicas abdominais, vômitos e diarreia, que apareceram duas horas após a ingestão de alimentos, deverá ter como principal agente infeccioso:

- a) Entamoeba histolytica
- b) Shigella sp
- c) Yersinia enterocolítica
- d) Staphylococcus aureus
- e) Salmonella sp