

### 1. A resposta certa é a letra D

Pullan e col. estudaram 72 pacientes portadores de retocolite ulcerativa em fase ativa com adesivos de nicotina e placebo, por um período de 06 meses. Uma melhora significativa foi demonstrada no grupo que usou adesivos de nicotina. O mecanismo do efeito da nicotina é ainda desconhecido.

*Corman ML, Colon and Rectal Surgery. 4ª ed. Lippincott-Raven 1998; 1112.*

### 2. A resposta certa é a letra A

A nutrição das células do epitélio é feita por ácidos graxos de cadeia curta produzidos por fermentação bacteriana na luz do colo. Harig e col. encontraram que pequenas quantidades de ácidos graxos duas vezes ao dia resultam em desaparecimento dos sintomas e das alterações endoscópicas num período de até 6 meses.

*Corman ML, Colon and Rectal Surgery. 4ª ed. Lippincott-Raven 1998; 1112.*

### 3. A resposta certa é a letra C

A Doença de Cowden se caracteriza pela presença de pólipos gastrointestinais, lesões muco-cutâneas e anormalidades na mama e glândula tireóide, sendo uma doença hereditária autossômica dominante. Os pólipos são

na maioria hamartomas, porém podemos encontrar pólipos hiperplásicos e ocasionalmente adenomas. A transformação maligna destes pólipos ainda é incerta, mas o carcinoma de mama e da tireóide podem ocorrer.

*Mazier WP, Levien DH, Luchtefeld MA, Senagore AJ Surgery of Colon, Rectum and Anus W.B. Saunders Company 1995; :125*

### 4. A resposta certa é a letra E

Uma das complicações da bolsa colônica em J é a dificuldade no seu esvaziamento completo e que está relacionada com o comprimento da mesma. Os autores compararam 26 pacientes submetidos à bolsa colônica em J com 10 cm e 27 outros com bolsa em J com 5 cm. Foi determinado, por clister opaco, o ângulo formado pelo eixo longitudinal da bolsa e a linha horizontal (ângulo horizontal da bolsa) com 3,6 e 12 meses após a sua confecção. Este ângulo foi significativamente menor nas bolsas de 10 cm do que nas de 5 cm. A evacuação difícil observada nos pacientes com bolsas colônicas maiores, pode ser atribuída ao desenvolvimento de inclinação horizontal da bolsa, que ocorre no período de até 01 ano.

*Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, Uchida T, Wakano T, Kubor M. Horizontal Inclination of the Longitudinal Axis of the Colonic J-Pouch-Defining Causes of Evacuation Difficulty. Dis Colon Rectum 1999; 42: 1560-68.*