

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2003;23(1):61

1- Acredita-se que a pseudo obstrução colônica (Síndrome de Ogilvie) ocorra por:

- A- Hiperatividade vagal.
- B- Predomínio da atividade nervosa simpática sobre a parassimpática.
- C- Destruição dos plexos nervosos intramurais.
- D- Hipertrofia muscular da parede colônica.
- E- Ausência de relaxamento do músculo puborretal.

2- O risco de transmissão do HIV para profissionais de saúde com uma única picada de agulha:

- A- Independe do volume do líquido de exposição.
- B- Independe da profundidade de penetração da agulha.
- C- Independe da qualidade da agulha, se sólida (como as de sutura) ou com luz (como as de injeção).
- D- Independe do título de virus no líquido infectado.
- E- É estimado em 1 a cada 300 a 500 picadas com o sangue infectado (0,2 a 0,32 %).

3- As ulcerações " idiopáticas" do ânus relacionadas à AIDS:

- A- São múltiplas, rasas e pequenas.
- B- São mais distais que as fissuras comuns.
- C- Seu tratamento é empírico, com antibióticos de largo espectro.
- D- Não se relacionam ao estado imunológico, ocorrendo igualmente em pacientes com níveis de CD4 alto ou baixo.
- E- A injeção de corticosteróide local diminui bastante a dor, mesmo não curando a lesão.

4- Em relação aos lipomas colorretais:

- A- Existe um predomínio dos subserosos sobre os submucosos, na proporção de 5: 1.
- B- Têm grande propensão à malignização, devendo ser ressecados tão logo identificados.
- C- São bem mais comuns no colon esquerdo do que no direito.
- D- De um modo geral os lipomas inferiores a 2 cm são assintomáticos.
- E- Aderências com fistulização são os principais sintomas.