

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2003;23(3):229

1 - A síndrome do compartimento das extremidades inferiores em pós-operatório de cirurgia colorretal na posição de Lloyd-Davies:

- A - Independe do tempo de cirurgia, já que pressões críticas podem ser alcançadas em 10 minutos.
- B - Para desenvolvê-la é preciso que o paciente tenha doença vascular periférica prévia.
- C - As pressões no compartimento anterior da perna podem levar horas para retornar aos valores normais, após o abaixamento das pernas.
- D - É provocada pelo estiramento dos nervos na posição de litotomia.
- E - Paralisia nervosa e insuficiência renal são consequências relatadas.

2 - Na ressecção retal com excisão total do mesorreto, a espessura da margem de ressecção lateral (ou circunferencial):

- A - É inversamente proporcional ao índice de recidiva local.
- B - Não se relaciona com o risco de metástases à distância.

- C - Não se relaciona com os índices de sobrevida.
- D - Não tem importância desde que a margem inferior seja acima de 2 cm.
- E - Assim como a margem inferior necessita ser acima de 2cm.

3 - A causa mais frequente de lesão do esfíncter anal é:

- A - Parto vaginal.
- B - Hemorroidectomia.
- C - Fistulotomia.
- D - Fistulectomia.
- E - Tratamento de fissura anal.

4 - A identificação de hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da retina deve levar à suspeita de:

- A - Agenesia anorretal.
- B - Doença de Hirschsprung.
- C - Doença de Crohn.
- D - Polipose adenomatosa familiar.
- E - Doença celíaca.