

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2005; 25(1):102

1- No seguimento pós-radioquimioterapia dos tumores epidermóides do canal anal:

- A- Dosagens repetidas do antígeno carcinoembrionário ajudam a detectar recidiva precoce.
- B- A colonoscopia deve ser feita anualmente para detectar tumores metacrônicos.
- C- A ultrassonografia endorretal pode ajudar no diagnóstico, não tendo valor no seguimento.
- D- O exame digital repetido regularmente permite suspeitar de recidiva com grande precisão.
- E- Ausência de recidiva em 5 anos significa cura da doença.

2- Paciente portador de retocolite ulcerativa inespecífica encontra-se em quadro de megacolon tóxico. Qual das seguintes substâncias não está indicada:

- A- Bloqueadores H2.
- B- Heparina em dose baixa.
- C- Corticosteróides.
- D- Mesalásina.
- E- Antibióticos de largo espectro.

3- A respeito da mucocele de apêndice, assinale a assertiva falsa:

- A- Seu encontro durante uma cirurgia videolaparoscópica deve levar à conversão para procedimento aberto.
- B- A ultrassonografia e a tomografia computadorizada podem ajudar no diagnóstico diferencial.
- C- Sua complicação mais temida é o pseudomixoma peritoneal.
- D- A aspiração com agulha fina guiada por tomografia computadorizada deve ser usada para confirmação diagnóstica pré-operatória.
- E- Pode ser tratada com apendicectomia ou colectomia direita, dependendo do caso.

4- A mucocele do apêndice está associada com maior frequência aos tumores de:

- A- Colon.
- B- Ovário.
- C- Rins.
- D- Cérebro.
- E - Mama.