

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCEP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2006; 26(1):99

1- É causa de dificuldade de esvaziamento de bolsa ileal pélvica:

- A- Alça eferente longa.
- B- Infecção bacteriana por *Campylobacter*.
- C- Complacência diminuída por sepse pélvica.
- D- Bolsite.
- E- Síndrome do intestino irritável.

2- Paciente com 78 anos de idade é submetido a ressecção endoscópica de pólipo pediculado de sigmóide. O exame histopatológico mostra um adenoma totalmente excisado, com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, contendo uma área de adenocarcinoma bem diferenciado invadindo a submucosa na junção do pedículo com a cabeça do pólipo. Na classificação de Haggitt de fatores prognósticos para adenocarcinomas que nascem em pólipos, este seria classificado como nível:

- A- 0
- B- 1
- C- 2
- D- 3
- E- 4

3- Ainda em relação ao caso descrito na questão 2, assinale a assertiva correta com respeito à conduta, considerando-se que os exames de imagem (tomografia abdominal total e Radiografia de tórax) foram normais:

- A- Havendo invasão da submucosa o consenso universal é por realizar uma colectomia com linfadenectomia radical.
- B- Havendo uma invasão apenas da submucosa é mandatória uma colectomia, mas pode ser econômica, sem grandes ressecções de meso.

- C- Podemos assumir uma atitude expectante, já que o risco de comprometimento linfonodal é menor que o risco cirúrgico.
- D- O comprometimento fora da cabeça do pólipo, na junção com o pedículo, torna inviável qualquer atitude conservadora.
- E- Podemos garantir um melhor resultado à polipectomia se acrescentarmos uma quimioterapia adjuvante.

4- A respeito da fotocoagulação (infrared coagulation) no tratamento da doença hemorroidária podemos afirmar que:

- A- Acompanha-se de alto índice de estenose e sepse.
- B- Sua melhor indicação são os mamilos que requerem redução manual do prolapso.
- C- São idealmente usadas para o componente hemorroidário externo.
- D- A obrigatoriedade de anestesia mais importante, com bloqueio ou sedação, faz com que perca a indicação frente a outros métodos de tratamento.
- E- Sua melhor indicação são as hemorróidas internas sintomáticas que sejam muito pequenas para uma ligadura elástica.