

1. Qual das seguintes afirmações está correta em relação a angiodisplasia de cólon?

- A. Fulguração da angiodisplasia deve ser realizado durante uma colonoscopia eletiva independente da história de sangramento anterior.
- B. O sangramento da angiodisplasia é mais comum no lado esquerdo no paciente idoso
- C. Uma angiografia normal durante um sangramento ativo exclui angiodisplasia como causa da hemorragia.
- D. As angiodisplasias variam de 1,5 a 2 mm e histologicamente são caracterizadas por capilares dilatados e tortuosos localizados na lamina própria.

2. Quando comparamos o uso da clorexidina alcoólica com a solução de iodopovidona na antisepsia de procedimentos cirúrgicos abdominais, podemos afirmar que a clorexidina:

- A. Apresenta melhor proteção que a solução de iodopovidona, mas apenas nas infecções superficiais da parede.
- B. Apresenta melhor proteção que a solução de iodopovidona em todos os sítios cirúrgicos, na parede e na cavidade.
- C. Apresenta melhor proteção que a iodopovidona na parede abdominal superficial e profunda, mas não na cavidade abdominal.
- D. É inferior à iodopovidona no que se refere à proteção da parede abdominal.

3. O agente etiológico e a droga de primeira linha para o tratamento da colite pseudomembranosa são, respectivamente:

- A. Clostridium difficile e Ciprofloxacino
- B. Chlamydia tracomatis e Metronidazol
- C. Clostridium difficile e Metronidazol
- D. Haemophilus ducreyi e Metronidazol

4. Em relação à doença diverticular do sigmóide, todas as afirmativas são corretas, exceto:

- A. O acesso vídeo-laparoscópico está contra-indicado, devido a aderências que impossibilitam a ressecção sigmoideana.
- B. Uma cistografia é particularmente útil nos casos suspeitos de fístula colo-vesical não demonstrada no enema baritado.
- C. Na diverticulite aguda complicada, encontra-se maior gravidade nos casos classificados como Hinchey IV.
- D. Estima-se que de 10 a 25% dos pacientes portadores de doença diverticular irão desenvolver um quadro de diverticulite aguda.