

1. Os seguintes tipos celulares representam variantes do carcinoma escamoso do canal anal exceto:

- a) Carcinoma cloacogênico
- b) Carcinoma basalóide
- c) Carcinoma de células transicionais
- d) Doença de Paget

2. Paciente portador de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado de cólon descendente aderido ao intestino delgado(10 cm de extensão) que o exame histopatológico revelou invasão da neoplasia comprometendo parte da parede muscular do delgado e dos 16 linfonodos examinados 5 eram metastáticos. O estadiamento pelo AJCC/ 2002 é:

- a) IIC
- b) IIIA
- c) IIB
- d) IIIB

3. Observando a anatomia vascular do colon e do reto, qual dos seguintes itens é verdadeiro:

- a) A artéria mesentérica inferior localiza-se 5 cm acima do promontório sacral;
- b) A artéria ileocólica está ausente em 20% dos pacientes;
- c) A artéria mesentérica inferior nasce da aorta abdominal 3 a 4 cm abaixo da terceira porção do duodeno;
- d) O ramo ascendente da artéria mesentérica inferior origina a artéria retal superior que é o principal suprimento sanguíneo para o reto.

4. Em relação ao carcinóide de reto, é correto dizer:

- a) Radio e quimioterapia neoadjuvante é o tratamento inicial de escolha;
- b) Têm origem nas células de Kulchitsky;
- c) A determinação da excreção urinária do 5-HIAA é útil para o seu diagnóstico;
- d) A incidência de tumores sincrônicos e metacrônicos é muito rara.